

Use case 1 Waarneming

Scenario:

- Patiënt X gebruikt 6 chronische middelen en komt bij de HAP.
- Waarnemer grijpt in staakt 2 medicatie
 - Amlodipine accord tablet stoppen
 - Spironolacton accord tablet omhuld stoppen
 - Bisoprololfumaraat accord tablet filmomhuld starten
 - Eplerenon mylan tablet filomhuld starten
- De overige medicatie wordt ook uitgegeven

Begin situatie

Patiënt

999910802	A van XXX_Boerka	1954-08-10	V	Knolweg 1003, 9999ZA Enschede
-----------	------------------	------------	---	-------------------------------

Kies zelf: huisarts, verstreckende openbare apotheek, waarnemend HAP arts

Medicatieoverzicht

Actuele medicatie:

Geneesmiddel	Amlodipine accord tablet ZI 15724506 AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG HPK 2204886 AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG PRK 123323 AMLODIPINE TABLET 10MG GPK 155624 AMLODIPINE TABLET 10MG
Sterkte	10 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	12 mei 2017

Geneesmiddel	Spironolacton accord tablet omhuld ZI 15446948 SPIRONOLACTON ACCORD TABLET OMHULD 25MG HPK 2002817 SPIRONOLACTON ACCORD TABLET OMHULD 25MG PRK 3662 SPIRONOLACTON TABLET 25MG GPK 11770 SPIRONOLACTON TABLET 25MG
Sterkte	25 mg
Dosering	1 x daags 1 tablet
Duur	Continu
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	30 stuks
Afleverdatum	12 mei 2017

Geneesmiddel	Grepid tablet filmomhuld ZI 16188527 GREPID TABLET FILMOMHULD 75MG HPK 2047519 GREPID TABLET FILMOMHULD 75MG PRK 124559 CLOPIDOGREL TABLET 75MG GPK 156655 CLOPIDOGREL TABLET 75MG
Sterkte	75 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	12 mei 2017

Geneesmiddel	Isordil tablet ZI 13121774 ISORDIL TABLET 5MG HPK 416797 ISORDIL TABLET 5MG PRK 72265 ISOSORBIDEDINITRAAT TABLET SUBLINGUAAL 5MG GPK 119490 ISOSORBIDEDINITRAAT TABLET SUBLINGUAAL 5MG
Sterkte	5 mg
Dosering	Zonodig 1x daags 1 tablet onder de tong. Eventueel na 5 minuten herhalen, eventueel na nog 5 minuten een derde. Bij onvoldoende effect binnen 15 minuten arts waarschuwen (Angina Pectoris)
Duur	Continu
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	30 stuks
Afleverdatum	12 mei 2017

Geneesmiddel	Simvastatine accord tablet filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Sterkte	40 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	12 mei 2017

Gestopte medicatie:

Geneesmiddel	Perindopril tert-butyl/indapamide mylan t ZI 15538362 PERINDOPRIL TERT-BUTYL/INDAPAMIDE MYLAN T 4/1,25MG HPK 2069490 PERINDOPRIL TERT-BUTYL/INDAPAMIDE MYLAN T 4/1,25MG PRK 60577 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TABLET 4/1,25MG (ERBUMINE) GPK 114359 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TABLET 4/1,25MG (ERBUMINE)
--------------	--

Sterkte	4/1,25 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Stopdatum	11 mei 2017

Contra-indicaties en overgevoeligheden

Contra-indicaties:

Hypertensie

Ischemische hartziekten (incl. Agina pectoris)

Overgevoeligheden:

Sulfonamiden (arylamine +n1-substituent)

Sulfonamiden (niet-antibacterieel)

Extensie voor logistiek

In geval ook logistiek in de test wordt meegenomen, vul bij de eerste afspraak (Amlodipine accord tablet) naast MA en TA ook de volgende bouwstenen toe:

Verstrekkingverzoek:

Te verstrekken hoeveelheid	90 stuks
Aantal herhalingen	2

Verstrekking:

Verstreekte hoeveelheid	30 stuks
toelichting	vanwege mogelijke bijwerkingen eerst voor 30 dagen verstrekt
Aanvullende informatie	Aantal bewust gewijzigd

In de 4^e week van het gebruik spreekt de patiënt opnieuw met de huisarts, en de partner, die als mantelzorger fungeert, meldt dat de medicatie volgens afspraak genomen wordt, er geen bijwerkingen zijn en het middel goed lijkt te werken. De arts legt het medicatiegebruik vast:

Gebruikindicator	Ja
Volgens afspraak	Ja
Toedientijd	8:30
Informant	B. van XXX_Boerka (mantelzorger)
Auteur	De gekozen huisarts
Toelichting	geen bijwerkingen; werking afdoende

Daarop doet de huisarts een nieuw verstrekkingverzoek, opnieuw voor 90 stuks met 2 herhalingen, welke dit maal door de apotheek zonder aanpassingen omgezet wordt in een verstrekking.

Nieuwe situatie

Gestart:

Geneesmiddel	Bisoprololfumaraat accord tablet filmomhuld ZI 15860353 BISOPROLOLFUMARAAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 10MG HPK 2304198 BISOPROLOLFUMARAAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 10MG PRK 25542 BISOPROLOL TABLET 10MG GPK 66664 BISOPROLOL TABLET 10MG
Sterkte	10 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	15 juni 2017

Geneesmiddel	Eplerenon mylan tablet filomhuld ZI 16085728 EPLERENON MYLAN TABLET FILMOMHULD 50MG HPK 2474360 EPLERENON MYLAN TABLET FILMOMHULD 50MG PRK 73458 EPLERENON TABLET 50MG GPK 120367 EPLERENON TABLET 50MG
Sterkte	50 mg
Dosering	1 x daags 1 tablet
Duur	Continu
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	30 stuks
Afleverdatum	15 juni 2017

Onveranderd:

Geneesmiddel	Grepid tablet filmomhuld
Sterkte	75 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	15 juni 2017

Geneesmiddel	Isordil tablet
Sterkte	5 mg
Dosering	Zonodig 1x daags 1 tablet onder de tong. Eventueel na 5 minuten herhalen, eventueel na nog 5 minuten een derde. Bij onvoldoende effect

	binnen 15 minuten arts waarschuwen (Angina Pectoris)
Duur	Continu
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	30 stuks
Afleverdatum	15 juni 2017

Geneesmiddel	Simvastatine accord tablet filmomhuld
Sterkte	40 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Aantal	90 stuks
Afleverdatum	15 juni 2017

Gestaakte medicatie:

Geneesmiddel	Amlodipine accord tablet
Sterkte	10 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Stopdatum	14 juni 2017

Geneesmiddel	Spironolacton accord tablet omhuld
Sterkte	25 mg
Dosering	1 x daags 1 tablet
Duur	Continu
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Stopdatum	14 juni 2017

Was al gestaakt:

Geneesmiddel	Perindopril tert-butyl/indapamide mylan t
Sterkte	4/1,25 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	Chronisch
Toedieningswijze	Oraal
Max dosering	
Stopdatum	11 mei 2017

Contra-indicaties en overgevoeligheden

Contra-indicaties:

Hypertensie

Ischemische hartziekten (incl. Agina pectoris)

Overgevoeligheden:

Sulfonamiden (arylamine +n1-substituent)

Sulfonamiden (niet-antibacterieel)