

Use case 8 medicatiegebruik opleveren

Scenario:

- Patiënt ZZZ heeft behalve hoge bloeddruk ook last van een epilepsie aanvallen patiënt en na een val heeft hij verhevigde aanvallen. Zijn neuroloog maakt met ZZZ medicatieafspraken om van geneesmiddel te wisselen en de doseerschema aan te passen.
 - Patiënt ZZZ vraagt de medicatieafspraken op of krijgt ze toegestuurd.
 - Patiënt ZZZ rapporteert de volgende dag of hij de doseerschema heeft kunnen volgen en wat eventueel het effect is van de dosering.
 - Patiënt ZZZ gebruikt 2 chronische geneesmiddelen.
 - Patiënt ZZZ krijgt een doseerschema voor anti-epileptica.
 - Patiënt ZZZ geeft eens per dag feedback op het gebruik.
- Zijn huisarts/cardioloog/apotheker houdt Patiënt Z goed in de gaten en kijken graag mee naar het profiel van Z.

Begin situatie

Patiënt

999910838	A	XXX_Tols	19540812	M	Knolweg 1002, 9999ZZ Enschede
-----------	---	----------	----------	---	-------------------------------

Medicatieoverzicht

Actuele medicatie

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Sterkte	40mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Reden van voorschrijven	Hoog cholesterol-niveau

Geneesmiddel	Metoprolol ZI 14278588 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG HPK 1169254 METOPROLOLTARTRAAAT APOTEX TABLET 100MG PRK 7226 METOPROLOL TABLET 100MG GPK 17175 METOPROLOL TABLET 100MG
Sterkte	100 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Reden van Voorschrijven	Atriumfibrilleren

Geneesmiddel	Carbamazepine
--------------	---------------

	ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Sterkte	200 mg
Dosering	200 mg /dag, 1x daags verhogen tot 1200 mg/dag
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Reden van Voorschrijven	Epilepsie

Testscenario

De neuroloog heeft de Carbamazepine gestaakt en nieuwe anti-epileptica voorgeschreven. De dosering van de Keppra is als volgt:

- Keppra 250 mg tabletten.
 - a. Begindosering 2x 250 mg.
 - b. Na 2 weken verhogen naar 2x per dag 500 mg.
 - c. Indien nodig iedere 2 weken met 2x dag 250 verhogen tot maximaal 2x dag 1500 mg.

De neuroloog is een arts die met MP 9 participeert en het nieuwe medicatiebeleid van de neuroloog is zichtbaar in medicatieafspraken.

De patiënt vraagt Medicatiegegevens op. Als dat niet mogelijk is, dan worden de MA's direct naar de PGO opgestuurd.

- Patiënt ZZZ geeft aan, dat hij de oude anti-epileptica Carbamazepine niet meer gebruikt.
- Patiënt ZZZ rapporteert over een periode van 30 dagen zijn dagelijkse medicatiegebruik. Als het systeem geen dagelijkse rapportage kan registreren, dan kan dat ook het resume over een periode gaan.
- Bij de rapportage wordt ook afwijkend gebruik geregistreerd:
 - a. Patiënt ZZZ registreert in de 4^{de} week geen gebruik heeft met als reden "misselijkheid".
 - b. Patiënt ZZZ registreert in de 5^{de} week van de zo nodig dosering gebruik heeft gemaakt met als reden "toegenomen epilepsie aanvallen".

Exit situatie

Bij het opvragen van medicatiegebruik dienen de volgende gegevens zichtbaar te zijn.

Noot: Als er geen systemen zijn die MG kunnen opvragen, dan kijkt de zorgverlener mee in een portaal van de PGO.

Wat moet er getoond worden? Zowel de MA als het MG.

Actuele medicatie

Ongewijzigd:

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld
Sterkte	40mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal

Max dosering	
--------------	--

Geneesmiddel	Metoprolol
Sterkte	100 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Nieuw:

Geneesmiddel	Keppra ZI 13971824 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG HPK 890413 CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG PRK 7579 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG GPK 21016 CARBAMAZEPINE TABLET 200MG
Sterkte	250 mg, 500 mg, 1000 mg
Toedieningswijze	oraal
Dosering	2x dag 250 mg
Duur	Start periode van 2 weken
Dosering	tot 2x dag 500 mg
Duur	In de opvolgende periode
Dosering	Indien nodig 2x dag 250 mg
Duur	In week 4
Dosering	0
Duur	In week 5
Dosering	2500 mg

Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Carbamazepine
Sterkte	200 mg
Dosering	200 mg 1x daags verhogen
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	1200 mg/dag

Toetsingcriteria

- Bij de gestopte medicatie dient zichtbaar te zijn, dat de patiënt gestopt is met Carbamazepine.
- Het moet zichtbaar zijn, dat Keppra deze Carbamazepine opgevolgd heeft.
- Het moet voor de opvrager zichtbaar zijn, hoe patiënt ZZZ over een periode het geneesmiddel Keppra heeft gebruikt.