

Testcasussen Coloscopie maart 2014

Auteur: Marc de Graauw

Versie: 3

Datum: 30 maart 2013

Voor coloscopieverslagen moeten de volgende varianten doorlopen worden. De testcasussen zijn opgesteld vanuit de gebruikersinterface, dus met terminologie uit de dataset. Het is de bedoeling dat ze ook op die wijze worden aangemaakt.

Deze testcasussen horen bij Release v2.04 vanaf 2014-03-26 18:03:32

1. Coloscopieverslag waarbij niet de maximale lokatie bereikt is

Niet de maximale lokatie bereikt:

- Diepste punt insertie: "Sigmoid"
- Caecum intubatie: "false"
- Reden coecum niet bereikt: "Klinische toestand van de patient"

2. Coloscopieverslag met 2 incidenten

Incident/complicatie moet precies 2 keer voorkomen.

Type incident/complicatie moet precies 2 keer voorkomen.

Ernst incident/complicatie moet precies 2 keer voorkomen.

Interventie n.a.v. complicatie moet precies 2 keer voorkomen.

Reden afbreking coloscopie moet precies 1 keer voorkomen.

Vervolgbeleid n.a.v. afbreking coloscopie moet precies 1 keer voorkomen.

Eerste incident:

- type incident: "Perforatie a.g.v. coloscopie"
- ernst: "matig"

Tweede incident:

- type incident: "Anders"
- ernst: "mild"

Eerste interventie:

- interventie: "OTSC-clip"

Tweede interventie:

- interventie: "Anders"

Overige waarden:

- Reden afbreking coloscopie: "Complicatie"
- Vervolgbeleid n.a.v. afbreking coloscopie: " Opnieuw plannen coloscopie"

3. Coloscopieverslag met gedefinieerde voorbereiding, geen afwijkingen

Medicatiemiddel moet precies 2 keer voorkomen.

Medicatie tijdens coloscopie moet precies 2 keer voorkomen.

Dosering medicatie moet precies 2 keer voorkomen.

Mate van sedatie moet precies 1 keer voorkomen.

Incident/complicatie moet precies 0 keer voorkomen.

Type incident/complicatie moet precies 0 keer voorkomen.

Ernst incident/complicatie moet precies 0 keer voorkomen.

Interventie n.a.v. complicatie moet precies 0 keer voorkomen.

Overige interventie (tekst) moet precies 0 keer voorkomen.

CO2 insufflatie moet precies 1 keer voorkomen.

Coecum vastgelegd (2 foto's) moet precies 1 keer voorkomen.
Coecum intubatie moet precies 1 keer voorkomen.
Diepste punt insertie moet precies 0 keer voorkomen.
Totale terugtrektijd moet precies 1 keer voorkomen.
Retroflexie rectum moet precies 1 keer voorkomen.
Patiëntcomfort (GCS) moet precies 1 keer voorkomen.
Reden afbreking coloscopie moet precies 0 keer voorkomen.
Vervolgbeleid n.a.v. afbreking coloscopie moet precies 0 keer voorkomen.
Terugkoppeling cliënt moet precies 1 keer voorkomen.
Definitief Vervolgbeleid (groep) moet precies 1 keer voorkomen.
Definitief Vervolgbeleid moet precies 1 keer voorkomen.

In te vullen waarden voorbereiding:

- Split dose: "Nee (single dose)"
- Sedatiemiddel 1:
 - medicatie: "Midazolam"
 - dosering: 5 mg
- Sedatiemiddel 2:
 - medicatie: "Fentanyl"
 - dosering: 50 mcg
- Mate van sedatie: "Reageert niet"
- Intubatietijd: 15 min.
- CO2 insufflatie: "ja"
- Coecum vastgelegd: "ja"
- Coecum intubatie: "ja"
- Terugtrektijd coloscopie: 12 min.
- Retroflexie rectum: "ja"
- Patiëntcomfort (GCS): geen
- Terugkoppeling cliënt: "Geen afwijkingen"
- Definitief Vervolgbeleid: "Terug naar screening over n jaren"

4. Coloscopieverslag, met afwijkingen, met PA uitslagen

Medicatie tijdens coloscopie moet precies 1 keer voorkomen.
Dosering medicatie moet precies 1 keer voorkomen.
Mate van sedatie moet precies 1 keer voorkomen.
Incident/complicatie moet precies 0 keer voorkomen.
Interventie n.a.v. complicatie moet precies 0 keer voorkomen.
Diepste punt insertie moet precies 0 keer voorkomen.
Reden afbreking coloscopie moet precies 0 keer voorkomen.
Vervolgbeleid n.a.v. afbreking coloscopie moet precies 0 keer voorkomen.
Terugkoppeling cliënt moet precies 1 keer voorkomen.
Definitief Vervolgbeleid (groep) moet precies 1 keer voorkomen.
Definitief Vervolgbeleid moet precies 1 keer voorkomen.
Periode vervolg surveillance/coloscopie moet precies 1 keer voorkomen.
Eindconclusie moet precies 1 keer voorkomen.
Diameter poliep moet precies 2 keer voorkomen.
Morfologie moet precies 2 keer voorkomen.
Klinische diagnose moet precies 2 keer voorkomen.
Lokalisatie laesie moet precies 2 keer voorkomen.
Manier van verwijderen moet precies 2 keer voorkomen.
Circumferentie moet precies 1 keer voorkomen.

In te vullen waarden voorbereiding:

- Sedatiemiddel:
 - medicatie: "Midazolam"
 - dosering: 10 mg
- Mate van sedatie: " Slaapt, reageert bij aanraken"

- Terugkoppeling cliënt: "Poliepen verwijderd, afwachten pathologie"
- Definitief Vervolgbeleid: "Verwijzing naar polikliniek voor verdere behandeling voor (voorloper) darmkanker"
- Eindconclusie: "Colorectaal carcinoom (CRC)"
- Totaal aantal gedetecteerde poliepen: '2'
- Aantal poliepen niet ingezonden / gegevens niet vastgelegd: '1'
- Poliep (coloscopiecentrum) 1:
 - Lokatie laesie: "Colon descendens"
 - Diameter poliep: "3 mm"
 - Morfologie: "Vlak verheven"
 - Klinische diagnose: "Adenomateus"
 - Manier van verwijderen: "Weggebiopteerd"
 - Carcinoom j/n: Nee
- Poliep (coloscopiecentrum) 2:
 - Lokatie laesie: " Sigmoid"
 - Diameter poliep: "25 mm"
 - Morfologie: "Gesteeld"
 - Manier van verwijderen: "Koud lissen"
 - Carcinoom j/n: Ja
 - Stenosereren ja/nee: Nee
 - Circumferentie: " Kwart tot half"